


Bulletin du jeudi 30 juillet 2026

Prévision de l'intensité des arrivées de sargasses à 4 jours



Absence Intensité faible Intensité moyenne Intensité forte

La Desirade	Moyen
Est Basse-Terre	Fort
Marie-Galante	Faible
Nord Grande-Terre	Fort
Sud Grande-Terre	Moyen
Les Saintes	Faible

Indice de confiance : 4/5

Prévisions de vent moyen (au large atlantique)

Jour	Dir.	Classe	Vent moy.(km/h)
31/07	←	Soutenu	32
01/08	←	Soutenu	25
02/08	←	Soutenu	25
03/08	←	Soutenu	32

Des arrivages plus localisés, mais encore parfois importants Les images des 3 derniers jours ont été analysées et les détections sont moyennes.


Des résidus de radeaux, parfois de taille notable, s'éternisent aux abords de la côte Au-Vent de la Basse-Terre et localement au sud de la Grande-Terre. Ils viennent s'accumuler sur les algues déjà présentes à la côte.

Plus au large et à l'est, des filaments sont bien visibles au nord de la Désirade, aux alentours de Petite-Terre, à l'est et sud de Marie-Galante, et dans les canaux des Saintes et de la Dominique. L'ensemble de la côte nord-est de la Grande-Terre et l'est de la Basse-Terre restent sous la menace directe d'échouements occasionnellement notables. Une partie du sud de la Désirade aussi continue à recevoir épisodiquement des apports assez répétitifs.

Marie-Galante, les Saintes comme le sud de la Grande-Terre voient passer dans un flux est-ouest la majeure partie des algues. Les arrivages étant plus occasionnels pour ces zones de l'archipel.

Surveillance au large à 15 jours

Indicateurs d'activité Sargasses au 26-07-2026



Chronique journalière de surface détectée lors des 15 derniers jours




Tendance à 15 jours

Pas de changement. Pour les semaines à venir, toujours beaucoup d'échouements à prévoir.


Tendance saisonnière des deux prochains mois

Une activité intense qui commencerait enfin à fléchir en fin de période Aux Antilles, la forte activité des algues sargasses devrait se poursuivre bien qu'une légère atténuation semble poindre au cours du mois d'août, même si la réelle baisse de production soit envisagée pour septembre.

La Guyane reste le plus souvent protégée par les courants.



Evolution mensuelle des surfaces détectées dans la zone A - Analyse des cycles saisonniers depuis 2011



Notice du bulletin

Météo-France opère depuis 2020, le bulletin d'information sur les afflux d'échouements de Sargasses sur les Antilles françaises et la Guyane. Dans le cadre de la mission Sargasses (Plan National I & II), le dispositif de surveillance et de prévision des échouements de Sargasses est depuis 2022, une mission institutionnelle.

Détection et modélisation

Les radeaux de sargasses sont détectés par télédétection (capteurs MODIS, OLCI en usage principal ; MSI et VIIRS en appui expert). Leur dérive est calculée via le modèle MOTHY de Météo-France, forcé par les champs de vent IFS (0,025°) et les courants Mercator (1/12°) et Arcan (1/36°).

Risque d'échouement & Carte composite

Évalué sur 4 niveaux — absence, faible, modéré, fort — en fonction du nombre, de la taille des nappes détectées et de la convergence de leurs trajectoires vers la côte. La carte superpose la circulation océanique journalière et les bancs détectés par satellite (OLCI, moyenne sur 3 jours).

Un **tableau de vent** complète le bulletin avec la direction et la force prévues, classées en 4 catégories (calme/faible, alizé modéré, alizé soutenu, vent fort), chacune associée à un impact attendu sur la dérive et le risque d'échouement.

Classe	Vent (km/h)	Interprétation locale
Calme/faible	< 15	Dérive lente dominée par les courants ; radeaux peu fragmentés
Alizé modéré	15– 25	Transport régulier : dérive progressive vers les îles si les courants sont favorables
Alizé soutenu	25 – 35	Dérive plus rapide ; fragmentation accrue ; échouements plus probables sur les côtes exposées
Vent fort	> 35	Mer agitée ; dispersion des radeaux mais poussée rapide vers le littoral possible

Indicateur d'activité

Des jauges à niveaux (faible à record) mesurent l'activité « sargassique » à J-3 par zone de surveillance, basées sur les surfaces estimées et comparées à la période 2011-2021 (sans 2013). Un pictogramme sous la jauge indique la tendance entre J-3 et J-9.

Chroniques et historique

Sur 15 jours : suivi de l'afflux de sargasses par zone, comparé aux moyennes des années précédentes (cellules grisées si nébulosité significative).

En tendance à deux mois, une comparaison de la présence de sargasses du mois M-1 est mise en perspective par rapport aux 2 dernières années, l'année 2018 et quelques statistiques sur la période de référence 2011-2021

Limites du dispositif

La couverture nuageuse reste la principale limite du suivi satellitaire, d'où un indice de confiance basé sur le taux de nébulosité. Un second indice de confiance porte sur l'évolution de l'activité (surfaces sur 7 jours vs moyenne). La chaîne actuelle ne permet pas d'estimer précisément les volumes d'algues ; les prévisions restent déclinées par grands secteurs côtiers exposés.